



# Carbon Paste



## Tilskudsfoder (Drøvtyggere)

## Kompletteringsfoder (Idisslare)

# 300 ml e (Pasta)



EW Nutrition GmbH  
Hogenbögen 1 • 49429 Visbek • Germany  
Tel. +49 4445 9868-0 • www.ew-nutrition.com

### DK: Sammensætning:

Vegetabilsk kul 20,00%, Natriumklorid, Kaliumklorid

**Analytiske bestanddele:** Råprotein 0,01 %, For råfedt 0,01 %, Træstov 11,00 %, Råaske 9,00 %, Vandindhold 71,50 %, Natrium 1,35 %

### Tillægsstoffer pr. kg:

*Teknologiske tilsætningsstoffer:*

Calciumpropionat (E282) 25.000 mg

**Fodring anbefaling:** Tildel indholdet af patronen ind i koens mund. Koen skal have en synkereflex. Sørg for at forhindre slimhinde beskadigelse af halsen. Fjern hæften af patronen og fastsæt patronen til doseringspistol. Indsæt det i munden fra siden langs tungen og tømme røret, så at koen kan nå at sluge pastaen.

### SV: Sammansättning:

Vegetabiliskt kol 20,00%, Natriumklorid, Kaliumklorid

**Analytiska beståndsdelar:** Råprotein 0,01 %, Råolja och råfett 0,01 %, Växtråd 11,00 %, Råaska 9,00 %, Vattn 71,50 %, Natrium 1,35 %

### Tillsätsämne per kg:

*Tekniska tillsatser:*

Kalciumpropionat (E282) 25.000 mg

**Utfodringsrekommendationer:** Administrera patronens innehåll direkt i kossans mun. Kossan måste ha en sväljreflex. Se till att du inte skadar slemhinnorna i strupen. Ta bort korgen från patronen och sätt fast patronen på doseringspistolen. Stoppa in den i munnen från sidan och längs med tungan och töm tuben så att kossan kan svälja pastan.

Lot. Nr.: /Produktionsdato:/Skal helst anvendes inden: Se påtrykke.  
Parti nr:/Tillverkningsdatum:/Bäst före: Se tryck.

αDEHB100006



GMP + FSA  
assured

*Små drøvtyggere:* 1-2 ml / kg legemsvægt

*Kvæg:* 100 - 300 ml

*Kalve:* 50 - 100 ml

1 pumpe­slag = 10 ml. Unik fodring at regulere fordøjelsen (tynde afføring, etc.), hvis der kræves en anden dosis kan denne gives efter 1-3 timer.

Opbevares koldt (5 - 25 ° C), fri for frost, tørr og undgå sollys! Efter åbning skal produktet forbruges så hurtigt som muligt. Intet ansvar i tilfælde af forkert håndtering eller opbevaring.

*Små idisslare:* 1-2 ml/kg kroppsvikt

*Boskap:* 100-300 ml

*Kalvar:* 50-100 ml

1 pumpdrag = 10 ml. En enda dos för att reglera matsmältningen (lös mage osv.). Om så krävs kan en andra dos ges efter 1-3 timmar.

Förvaras på en sval (5-25 °C), frostfri, torr och mörk plats! Bör förbrukas så snabbt som möjligt efter öppnandet. Inget skadeståndsansvar vid felaktig hantering eller förvaring.

