

Havre Vinger

Sein havre – gode egenskaper

Tidlighet

Vinger har en veksttid på om lag 112 dager. Dette er 2 dager seinere enn Haga og 2 dager tidligere enn Belinda.

Såmengde

1000-kornvekta (TKV) for Vinger er i forsøka målt til ca 35 gram. Med et ønsket plantetall på 525 pl/m² vil såmengden være ca 21-22 kg/daa ved en spire% på 90.

Gjødsling

Vinger har behov for 9-12 kg N per dekar. Størst mengde brukes ved tidlig såing, forventning om høy avling og ensidig korndyrking. Det må tas hensyn til egne erfaringer og lokale forsøksresultater ved valg av gjødselmengder. Økt N-mengde øker faren for legde.

Vekstregulering

Vekstregulering til Vinger må vurderes utfra vekstforholdene. Er åkeren frodig og det er gode fuktighetsforhold på 4-5-bladstadiet (Z14) bør CCC-sprøyting foretas. Moddus Start kan benyttes fra Z25 til Z32 (synlig andre leddknote). Trimaxx kan brukes fra Z31 (synlig første leddknote) til Z37 (synlig spiss flaggblad). Se Plantevern-katalogen.

Ugraskontroll

Etter busking konkurrerer havre godt mot seint spirende ugras. Sprøyt derfor litt tidlig (når havreplantene har 2,5 – 3 blad) mot frøugras.

Sjukdommer

Vinger får lavere DON verdier enn Belinda ved smitteforsøk. I fuktige år og med ustabil vær rundt blomstring anbefales sprøyting med

60-80 ml Proline. Sprøytetidspunkt er når støvbærerne er synlige.

Avling

I gjennomsnitt for perioden 2017-2019 ligger Vinger 3% under Belinda i avling på Østlandet og 2% under i Trøndelag.

Sortsegenskaper

Vinger er en sein havre med godt avlingsnivå, god stråstyrke, god hektolitervekt og god tusenkornvekt. Proteininnholdet er middels. Sorten er blant de sterkere mot DON i smitteforsøk.

Forsøk med havre 2017-2019. Usprøyta felt. Relativ avling (kg/daa).

Tidlige sorter	Hele Østlandet	Sør-Østlandet	Nord-Østlandet	Trøndelag
Ringsaker	100 (509)	100 (507)	100 (508)	100 (506)
Haga	105	104	105	104
Odal	104	107	101	100
Ridabu	109	107	110	100
Seine sorter				
Belinda	100 (517)	100 (521)	100 (537)	100 (531)
Vinger	97	97	99	98
Våler	102	99	105	100

Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020



Sortsegenskaper til havresorter

Sort	Veksttid*	Stråstyrke	Strå-lengde	DON-verdi	Havre-brunflekk	HL-vekt	1000-kornvekt	Skall %	Spire-tregghet	Protein %	Fett%
Ringsaker	0	5	5	7	5	7	3	6	7	7	6
Haga	+2	6	7	3	4	6	4	6	4	6	5
Odal	+2	6	5	8	5	7	6	6	3	7	7
Ridabu	+3	7	7	3	5	5	4	6	5	5	6
Vinger	+4	7	5	7	5	6	6	6	3	6	4
Våler	+4	5	6	6	5	5	5	5	4	5	8
Belinda	+6	7	7	3	5	6	7	4	5	6	7

*Veksttid: Antall dager seinere enn Ringsaker

Andre egenskaper: 1= dårlig stråstyrke, langt strå, høye DON-tall, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt/1000-kornvekt, høy spiretregghet, lav protein/fett%
Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020

Sortseier: Graminor

Tlf: 72 50 50 50
www.felleskjopet.no

